به نام خدا

پایه دوازدهم تجربی

فصل اول: تابع

درس اول: توابع چندجمله‌ای-توابع صعودی و نزولی

قسمت اول: (توابع چند جمله ای- آشنایی با تابع درجه سوم)

جلسه اول: صفحات ۲تا ۵

مدرس: سید ابوالفضل فاضلیان

اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

معاونت آموزش متوسطه

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی

گروه ریاضی استان همدان

توابع چند جمله‌ای :

توابعی که ضابطه آن‌ها به صورت $f(x)=a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ است و در آن a_n تا a_0 اعداد حقیقی و $a_n \neq 0$ است، تابع چند جمله‌ای درجه n نامیده می‌شود.

دقت کنید توان xها باید اعداد حسابی باشند. بیشترین توان xها درجه چند جمله‌ای است.

مثال : کدام‌یک از توابع زیر چند جمله‌ای است ؟

الف) $f(x)=\frac{1}{x}$ نیست

ب) $g(x)=4x^2+\sqrt{5}x-1$ هست (تابع درجه دوم)

پ) $k(x)=\sqrt{x+2}$ نیست

ت) $q(x)=7x+\frac{1}{2}$ هست (تابع خطی)

ث) $p(x)=5$ هست (ثابت)

ج) $k(x)=x^{\frac{1}{4}}+4x$ نیست

نکته: توابع خطی، همانی، ثابت و درجه دوم، همگی تابع چندجمله‌ای هستند.

$y=ax+b$ $y=x$ $y=c$ $y=ax^2+bx+c$

نکته: دامنه تمام توابع چندجمله‌ای $\mathbb{R}$ است. همچنین بردِ تمام توابع چندجمله‌ای از درجه فرد هم $\mathbb{R}$ است.

تابع چندجمله‌ای درجه سوم:

هر تابع با ضابطه $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ که در آن $a,b,c,d\in\mathbb{R}$ و $a\neq 0$ باشد را یک تابع چندجمله‌ای درجه سوم می‌نامیم.


مانند: $f(x)=2x^3-\frac{1}{4}x^2+\sqrt{5}x+\pi$


$g(x)=8x^3+1$, $h(x)=5x^3-7x^2$

نمودار توابع $y=x^3$ و $y=-x^3$

x	-1	0	1	2
$y=x^3$	-1	0	1	8

x	-1	0	1	2
$y=-x^3$	1	0	-1	-8





هر دو نمودار نسبت به مبدأ مختصات متقارن اند

نکته: برای رسم توابع درجه سوم از قوانین انتقال برای رسم نمودارها کمک می‌گیریم.

مثال: نمودار تابع $f(x)=x^4+3x^2+3x+4$ را رسم کنید.

$1+3$

باید تابع درجه سوم را به صورت $y=k(x-a)^4+b$ در آوریم.


یادآوری: اتحاد مکعب دوجمله‌ای:

$$(a+b)^4=a^4+3a^2b+3ab^2+b^4$$

$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 + 4 = (x+1)^3 + 4$

اتحاد


نمودار $y = x^3$ را چهار واحد به سمت بالا و یک واحد به سمت چپ انتقال می‌دهیم.





کار در کلاس


به کمک نمودار تابع $y=x^3$، ضابطهٔ هر تابع را به نمودار آن نظیر کنید.


الف) $y=(x-1)^3+2$ ۶
ب) $y=(x-2)^3$ ۹
پ) $y=-x^3+1$ ۸
ت) $y=(x+1)^3-1$ ۷
ث) $y=-x^3$ ۵
ج) $y=(x+1)^3$ ۱
ج) $y=x^3+1$ ۴
ح) $y=-x^3-1$ ۳
خ) $y=x^3-2$ ۲



(۱)



(۲)



(۳)



(۴)


(۵)


(۶)


(۷)


(۸)



(۹)

نکته: در توابع درجه سوم به صورت $y=k(x-a)^3+b$، نقطه (a,b) مرکز تقارن است. می‌توان از این نقطه در رسم سریع نمودار توابع درجه سوم کمک گرفت.


مثال: نمودار تابع $y=-(x-1)^3+2$ را رسم کنید.

پایه: $y=-x^3$

مرکز تقارن $(1,2)$



مقایسه نمودارهای $y=x^3$ و $y=x^2$:



۱- دو نمودار در نقاط $(1,1)$ و $(0,0)$ متقاطع‌اند.


۲- برای $x>1$، $y=x^3$ بالای $y=x^2$ است.

۳- برای $0<x<1$ و $x<0$ نمودار $y=x^2$ بالای $y=x^3$ است.

مثال: نمودار تابع $y=x^3+6x^2+12x+1$ از کدام ناحیه محورهای مختصات عبور نمی‌کند؟


$y=x^3+3\times 2x^2+3\times(2)^2x+8-8+1=(x+2)^3-7$ مرکز تقارن $(-2,-7)$

اتحاد



از ناحیه چهارم عبور نمی‌کند.

مثال: نمودار تابع $g(x)=-x^3+ax^2+bx+c$ به شکل زیر است. مقدار a,b را بیابید.



مرکز تقارن $(2,k)$

در برش‌کس: ضریب x^3 نمی‌تی

از روی نمودار: $g(x)=-(x-2)^3+k=-(x^3+3x^2(-2)+3x(-2)^2+(-2)^3)+k$

$g(x)=-x^3+6x^2-12x+8+k=-x^3+ax^2+bx+c$

$\begin{cases} a=6 \\ b=-12 \end{cases}$

به نام خدا

پایه دوازدهم تجربی

فصل اول: تابع

درس اول: توابع چندجمله‌ای-توابع صعودی و نزولی

قسمت دوم: (توابع صعودی و نزولی)

جلسه دوم: صفحات ۶ تا ۱۰

مدرس: سید ابوالفضل فاضلیان

اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

معاونت آموزش متوسطه

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی

گروه ریاضی استان همدان


تعریف تابع صعودی :

اگر برای هر دو نقطه x_1 و x_2 از مجموعه A ($A \subseteq D_f$) که $x_2 > x_1$ داشته باشیم

$f(x_2) \geq f(x_1)$ آنگاه تابع f را تابع صعودی می‌نامیم.

به عبارت دیگر در تابع صعودی ، با افزایش x ، y افزایش می‌یابد یا ثابت می‌ماند.

مثال :



با حرکت از چپ به راست هیچگاه پائین نمی‌رویم


تعریف تابع اکیداً صعودی

اگر برای هر دو نقطه x_1 و x_2 از مجموعه A ($A \subseteq D_f$) که $x_2 > x_1$ داشته باشیم

$f(x_2) > f(x_1)$ آنگاه تابع f را تابع اکیداً صعودی می‌نامیم.

به عبارت دیگر در تابع اکیداً صعودی ، با افزایش x ، y هم افزایش می‌یابد.

مثال :




با حرکت از چپ به راست همواره بالا می‌رویم.

تعریف تابع نزولی:

اگر برای هر دو نقطه x_1 و x_2 از مجموعه A ($A \subseteq D_f$) که $x_2 > x_1$ داشته باشیم

$f(x_2) \leq f(x_1)$ آنگاه تابع f را تابع نزولی می‌نامیم.

به عبارت دیگر در تابع نزولی، با افزایش x یا y کاهش می‌یابد یا ثابت می‌ماند.



مثال:


با حرکت از چپ به راست هیچ‌گاه بالا نمی‌رویم

تعریف تابع اکیداً نزولی:

اگر برای هر دو نقطه x_1 و x_2 از مجموعه A ($A \subseteq D_f$) که $x_2 > x_1$ داشته باشیم

$f(x_2) < f(x_1)$ آنگاه تابع f را تابع اکیداً نزولی می‌نامیم.

به عبارت دیگر در تابع اکیداً نزولی، با افزایش x، y کاهش می‌یابد.




مثال:

با حرکت از چپ به راست همواره پائین می‌رویم

نکته: هر تابع اکیداً صعودی، صعودی هم هست و هر تابع اکیداً نزولی، نزولی هم هست.

ولی عکس این مطلب درست نیست.


مثال: تابع $y=[x]$ صعودی است ولی اکیداً صعودی نیست.



نکته: اگر با افزایش x، y ثابت بماند می‌گوییم تابع ثابت است. تابع ثابت هم صعودی است

و هم نزولی.

مثال:



تعریف تابع اکیداً یکنوا: اگر تابع f روی مجموعه A ($A \subseteq D_f$) اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی

باشد، می‌گوییم تابع f روی مجموعه A اکیداً یکنوا است.

تعریف تابع یکنوا: اگر تابع f روی مجموعه A ($A \subseteq D_f$) صعودی یا نزولی باشد، می‌گوییم


تابع f روی مجموعه A یکنوا است.

نکته: اگر در تابعی با افزایش x و حرکت از چپ به راست روی نمودار، y گاهی ادامه‌ت افزایش و گاهی ادامه‌ت کاهش یابد، این تابع را غیر یکنوا می‌گوییم.

دقت کنید ممکن است تابعی روی دامنه‌اش غیر یکنوا باشد ولی روی زیر مجموعه‌هایی از دامنه‌اش یکنوا باشد.


بررسی یکنوایی توابع معروف:

۱) $y = x^2$




غیر یکنوا ولی در $(-\infty, 0]$ اکیداً نزولی و در $[0, +\infty)$ اکیداً صعودی

۲) $y = x^3$




اکیداً یکنوا (اکیداً صعودی)

۳) $y = -x^3$




اکیداً یکنوا (اکیداً نزولی)

۴) $y=|x|$




نزولی
ولی در $[0,+\infty)$ اکیداً صعودی
و در $(-\infty,0]$ اکیداً نزولی

۵) $y=\sqrt{x}$




اکیداً صعودی (اکیداً صعودی)

۶) $y=a^x \quad (a>1)$




اکیداً صعودی (اکیداً صعودی)

۷) $y=a^x \quad (0<a<1)$



اکیداً صعودی (اکیداً نزولی)


۸) $y=\log_a x \quad (a>1)$




اکیداً صعودی (اکیداً صعودی)

۹) $y=\log_a^x \quad (0<a<1)$

اکیداً نزولی و اکیداً نزولی)




۱۰) $y=\sin x$




خزیکنوا دی مثنا در $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ تابع اکیداً صعودی در $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ تابع اکیداً نزولی است.

۱۱) $y=\cos x$



خزیکنوا دی مثنا در $[\pi, 2\pi]$ تابع اکیداً نزولی در $[0, \pi]$ تابع اکیداً صعودی است.

۱۲) $y = \frac{1}{x}$



$-1 < 1 \rightarrow f(-1) < f(1)$


$-1 \quad 1$

صعودی

نمودار تابع در $(-\infty, 0)$ و $(0, +\infty)$ نزولی است

اکیداً نزولی است

۱۳) $y = -\frac{1}{x}$



$-1 < 1 \rightarrow f(-1) > f(1)$

$-1 \quad 1$


نزولی

نمودار تابع در $(-\infty, 0)$ و $(0, +\infty)$ صعودی است

اکیداً صعودی است

مثال: با توجه به نمودار تابع f، بازه‌ای که آن را بررسی کنید.


الف)



نمودار تابع در $[-2, -\infty)$ و $(0, +\infty)$ نزولی و در $[-2, 0]$ اکیداً صعودی


اکیداً نزولی

ب)




بازه (نزولی)

ب)




اکیداً نزولی (اکیداً نزولی)

ث)




اکیداً نزولی (اکیداً صعودی)

ت)



غیر یکنوا

ج)



غیر یکنوا

مثال: تابع $f=\{(1,2),(2,m-1),(4,7-m)\}$ صعودی است. حدود m را بیابید.


(۱) $1<2 \rightarrow f(1)\leq f(2) \Rightarrow 2\leq m-1 \Rightarrow m\geq 4$

(۲) $2<4 \rightarrow f(2)\leq f(4) \Rightarrow m-1\leq 7-m \Rightarrow 2m\leq 8 \rightarrow m\leq 4$

(۱) $\cap$ (۲) $\Rightarrow$ $4\leq m\leq 4$

مثال: تابع $y=\begin{cases} x-4 & x<-2 \\ 2 & -2\leq x<4 \\ -2x+4 & x\geq 4 \end{cases}$ روی بازه $(a,-\infty)$ صعودی است.

بیشترین مقدار برای a را محاسبه کنید.



تابع صعودی : $(-\infty, 4)$


$\downarrow$

a

$\Rightarrow a = 4$

نکته : طبق آنچه دیدیم تابع $y = ax^2 + bx + c$ روی $\mathbb{R}$ غیریکنوا است ولی

الف) $a > 0$



اکیداً نزولی در $(-\infty, -\frac{b}{2a}]$ اکیداً صعودی در $[-\frac{b}{2a}, +\infty)$

ب) $a < 0$



اکیداً صعودی در $(-\infty, -\frac{b}{2a}]$ اکیداً نزولی در $[-\frac{b}{2a}, +\infty)$


همچنین می‌توان گفت سهمی در هر بازه‌ای که راس سهمی درون آن بازه باشد غیریکنوا است.

مثال : تابع درجه دوم $f(x) = (k+2)x^2 + x$ با دامنه $(-\infty, 1]$ صعودی است.

حدود k را بیابید.

$a < 0 \Rightarrow k + 2 < 0 \Rightarrow k < -2$ (1)

$$\text{راس سهمی} = \frac{-b}{2a} = \frac{-1}{2(k+2)} \geq 1$$



$$\frac{-1}{2(k+2)} - 1 \geq 0 \xrightarrow{\times(-1)} \frac{1}{2(k+2)} + 1 \leq 0 \Rightarrow \frac{1+2k+4}{2(k+2)} \leq 0 \Rightarrow \frac{2k+5}{2(k+2)} \leq 0$$

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	-2	$+\infty$
$2k+5$	$-$	0	$+$	$+$
$2(k+2)$	$-$	$-$	0	$+$
$\frac{2k+5}{2(k+2)}$	$+$	0	$-$	$+$

$$-\frac{5}{2} \leq k < -2 \quad (2) \Rightarrow (1) \cap (2) = -2 < k \leq -\frac{5}{2}$$

مثال: تابع نمایی $y = (k^2-1)^x$ اکیداً صعودی است. حدود k را بدست آورید.

$$a > 1 \Rightarrow \quad k^2 - 1 > 1 \Rightarrow k^2 > 2 \Rightarrow k > \sqrt{2} \text{ یا } k < -\sqrt{2}$$

قضیه:

الف) فرض کنید تابع f در یک فاصله اکیداً صعودی باشد و a و b متعلق به این فاصله باشند. اگر $f(a) < f(b)$ آنگاه $a < b$.

ب) فرض کنید تابع f در یک فاصله اکیداً نزولی باشد و a و b متعلق به این فاصله باشند. اگر $f(a) < f(b)$ آنگاه $a > b$.

اثبات : الف) چون تابع f اکیداً صعودی است پس اگر $a<b$ آنگاه $f(a)<f(b)$.

حکم — فرض

حال اگر عکس نقیض این گزاره بنویسیم اثبات زیر را می‌یابیم :

اگر $f(a)\leq f(b)$ آنگاه $a\leq b$ ■

ب) به عنوان تمرین، حل شود.

تذکر : پس می‌توان گفت اگر تابع f (اکیداً) صعودی باشد آن را از دو طرف نامساوی حذف کنیم، جهت نامساوی تغییر نمی‌کند ولی اگر f (اکیداً) نزولی باشد، با حذف آن از دو طرف، جهت نامساوی برعکس می‌شود.

مثال : اگر تابع f روی $\mathbb{R}$ نزولی باشد و $f(a^2-1)>f(3a+4)$، حدود a را بیابید.

$$f(a^2-1)>f(3a+4) \xrightarrow{f\text{ نزولی}} a^2-1<3a+4$$

$$a^2-3a-4<0 \Rightarrow (a+1)(a-4)<0 \Rightarrow -1<a<4$$

ریشه‌ها: -1 و $+4$

مثال: مجموعه جواب نامعادلات زیر را بیابید.

الف) $16^{2x-2} \geq 8^{3x-1}$

$(2^4)^{2x-2} \geq (2^3)^{3x-1} \Rightarrow 2^{8x-8} \geq 2^{9x-3} \xrightarrow[\text{افزایشی}]{a>1} 8x-8 \geq 9x-3$

$8x-9x \geq -3+8 \Rightarrow -x \geq 5 \Rightarrow x \leq -5 \rightarrow$ مجموعه جواب $= (-\infty, -5]$

ب) $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) > 2$ دامنه: $(x+1) > 0 \Rightarrow x > -1$ (1)

$\log_{\frac{1}{2}}(x+1) > \log_{\frac{1}{2}}(\frac{1}{2})^2 \xrightarrow[\text{کاهشی}]{0<a<1} x+1 < \frac{1}{4} \rightarrow x < \frac{1}{4} - 1$

$x < -\frac{3}{4}$ (2) (1) و (2) $\rightarrow -1 < x < -\frac{3}{4} \rightarrow$ مجموعه جواب $= (-1, -\frac{3}{4})$

پ) $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{2x+1} > (\sqrt{3}+\sqrt{2})^{x+2}$

$\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{1} \times \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{3-2}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = (\sqrt{3}-\sqrt{2})^{-1}$

$(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{2x+1} > ((\sqrt{3}-\sqrt{2})^{-1})^{x+2} \Rightarrow (\sqrt{3}-\sqrt{2})^{2x+1} > (\sqrt{3}-\sqrt{2})^{-x-2}$

$\xrightarrow[\text{کاهشی}]{0<a<1}$ ($\sqrt{3}-\sqrt{2}$ ↑) $2x+1 < -x-2 \Rightarrow 2x+x < -2-1 \Rightarrow 3x < -3$

$\Rightarrow x < -1 \rightarrow$ مجموعه جواب $= (-\infty, -1)$

نکته :

۱) اگر توابع f و g صعودی باشند آنگاه $f+g$ هم صعودی است .

۲) اگر توابع f و g نزولی باشند آنگاه $f+g$ هم نزولی است .

۳) اگر توابع f و g صعودی باشند و مقادیر این دو همگی مثبت باشند آنگاه $f \times g$ هم صعودی است .

۴) اگر توابع f و g نزولی باشند و مقادیر این دو همگی مثبت باشند آنگاه $f \times g$ هم نزولی است .

۵) اگر f صعودی باشد آنگاه $-f(x)$ نزولی است .

و اگر f نزولی باشد آنگاه $-f(x)$ صعودی است .

۶) اگر f صعودی باشد و مقادیر f همگی مثبت یا همگی منفی باشند آنگاه $\frac{1}{f}$ نزولی است .

۷) اگر f نزولی باشد و مقادیر f همگی مثبت یا همگی منفی باشند آنگاه $\frac{1}{f}$ صعودی است .

۸) اگر f صعودی و g نزولی باشد $g-f$ صعودی و $f-g$ نزولی است .

مثال: اگر f تابعی نزولی با مقادیر منفی باشد، کدام تابع نزولی است؟

۱) $y=2^x f(x)$ ✓ ۲) $y=\frac{f(x)}{2^x}$ ۳) $y=2^x+f(x)$ ۴) $y=2^x-f(x)$

تابع f تابعی نزولی با مقادیر منفی است. پس تابع $-f$ تابعی صعودی با مقادیر مثبت است.

همچنین تابع $y=2^x$ تابعی صعودی با مقادیر مثبت است. پس ضرب این دو تابع یعنی

$2^x f = 2^x \times (-f) = -2^x f$ تابعی صعودی است. پس $y=2^x f$ تابعی نزولی است.

مثال: اگر $f+g$ و $g-f$ توابعی نزولی با دامنه $\mathbb{R}$ باشند، کدام تابع صعودی است؟

۱) f ۲) g ۳) $-f$ ۴) $-g$ ✓

$h=(f+g)+(g-f)=2g$ نزولی + نزولی = نزولی

$\Rightarrow k=-\frac{1}{2}(2g)=-g$ نزولی منفی = صعودی

به نام خدا

پایه دوازدهم تجربی

فصل اول: تابع

درس دوم: ترکیب توابع

صفحه: ۱۱ تا ۱۴

مدرس: سید ابوالفضل فاضلیان

اداره کل آموزش و پرورش استان همدان


معاونت آموزش متوسطه

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی


گروه ریاضی استان همدان

ترکیب توابع :

اگر f و g دو تابع باشند، ماشین این توابع را به صورت های زیر در نظر بگیرید :




xهای که حق ورود به f را دارند خیلی در D_f هستند وارد تابع f می شوند و عمل f روی x انجام می پذیرد و $f(x)$ تحویل داده می شود. اگر $f(x)$ ها اجازه ورود به g را داشته باشند خیلی در D_g باشند، ماشین g روی $f(x)$ اثر کرده و $g(f(x))$ را به عنوان خروجی تحویل می دهد.



در شکل دوم، x هایی که حق ورود به g را دارند یعنی در دامنه g هستند وارد ماشین تابع می‌شوند و خروجی g(x) تحویل داده می‌شود. اگر g(x) اجازه ورود به f را داشته باشد یعنی در دامنه f باشد، ماشین f روی g(x) اثر کرده و f(g(x)) را تحویل می‌دهد.

همین مفهوم را در نمودار ون هم ببینیم.



تمرین: نموداری مشابه، نمودار بالا برای f(g(x)) رسم کنید.

تعریف: ترکیب g با f را با $g\circ f$ نشان می‌دهیم و تابعی است که دامنه آن:

$$\{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

است و برای هر x در دامنه این تابع داریم:

$$(g\circ f)(x) = g(f(x))$$

تذکر: به همین ترتیب $f\circ g$ با دامنه $\{x\in D_g \mid g(x)\in D_f\}$ تعریف می‌شود که

برای هر x در این دامنه خودهم داشت: $(f\circ g)(x) = f(g(x))$.

مثال: اگر $f(x)=\sqrt{1-x^2}$ و $g(x)=\cos x$ باشند، $(f\circ g)(x)$ و $(g\circ f)(x)$

را بدست آورید.

یعنی در تابع f به جای x، $g(x)$ بگذارید: $(f\circ g)(x) = f(g(x))$

$$= \sqrt{1-\cos^2 x} = \sqrt{\sin^2 x} = |\sin x|$$

یعنی در تابع g به جای x، $f(x)$ بگذارید: $(g\circ f)(x) = g(f(x))$

$$= \cos\sqrt{1-x^2}$$

مثال: اگر $g=\{(1,1),(2,0),(3,-1)\}$ و $f=\{(1,2),(2,-1),(-1,1),(0,2)\}$ باشند، توابع fog و gof را تشکیل دهید.

fog: ست چپ ها ی g را می‌نویسیم و به g ها در برش بت می‌دهیم. بعد f را اثر می‌دهیم.

$$1 \xrightarrow{g} 1 \xrightarrow{f} 2$$
$$2 \xrightarrow{g} 0 \xrightarrow{f} 2$$
$$3 \xrightarrow{g} -1 \xrightarrow{f} 1$$


$$fog=\{(1,2),(2,2),(3,1)\}$$

gof: ست چپ ها ی f را می‌نویسیم و به g ها در برش بت می‌دهیم. بعد g را اثر می‌دهیم.

$$1 \xrightarrow{f} 2 \xrightarrow{g} 0$$
$$2 \xrightarrow{f} -1 \xrightarrow{g} \times$$
$$-1 \xrightarrow{f} 1 \xrightarrow{g} 1$$
$$0 \xrightarrow{f} 2 \xrightarrow{g} 0$$

$$gof=\{(1,0),(-1,1),(0,0)\}$$

مثال: اگر $f=\{(1,0),(2,3),(4,7)\}$ ، $g=\{(0,2),(1,1)\}$ باشند آیا gof تشکیل می‌شود؟ چرا؟



خلاصه‌ی آن: $R_f \cap D_g = \emptyset$

نتیجه: برای تشکیل gof باید $R_f \cap D_g \neq \emptyset$ باشد.

برای تشکیل fog باید $R_g \cap D_f \neq \emptyset$ باشد.

مثال: اگر $f(x)=\frac{2x-2}{x+1}$ ، $g(x)=\frac{x+3}{x-1}$ باشند، دامنه و ضابطه gof را به دست آورید.

$$(gof)(x)=g(f(x))=\frac{\frac{2x-2}{x+1}+3}{\frac{2x-2}{x+1}-1}=\frac{\frac{2x-2+3x+3}{x+1}}{\frac{2x-2-x-1}{x+1}}$$

$$(gof)(x)=\frac{5x+1}{x-3}$$

$$D_f=\mathbb{R}-\{-1\} \quad , \quad D_g=\mathbb{R}-\{1\}$$

$$D_{gof} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\} = \{x \in \underbrace{\mathbb{R} - \{-1\}}_{1} \mid \underbrace{\frac{2x-2}{x+1} \in \mathbb{R} - \{1\}}_{2}\}$$

۲: $\frac{2x-2}{x+1} \neq 1 \rightarrow 2x-2 \neq x+1 \rightarrow x \neq 3 \rightarrow x \in \mathbb{R} - \{3\}$

$\textcircled{1} \cap \textcircled{2}$

$$D_{gof} = \mathbb{R} - \{-1, 3\}$$

مثال: اگر $f(x) = \sqrt{x-2}$ و $g(x) = x^2 - 7$ باشند، دامنه و ضابطه fog را بیابید.

$$(fog)(x) = f(g(x)) = \sqrt{x^2 - 7 - 2} = \sqrt{x^2 - 9}$$

$$D_{fog} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} \qquad D_g = \mathbb{R} \qquad D_f = [2, +\infty)$$

$$= \{\underbrace{x \in \mathbb{R}}_{1} \mid \underbrace{x^2 - 7 \in [2, +\infty)}_{2}\}$$

۲: $x^2 - 7 \geq 2 \rightarrow x^2 \geq 9 \rightarrow x \geq 3$ یا $x \leq -3$

$\textcircled{1} \cap \textcircled{2}$: $D_{fog} = (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$

مثال: اگر $f(x)=\sqrt{3-2x}$ ، $g(x)=\frac{1}{3x-5}$ ، ضابطه $f\circ g$ را بنویسید، D_{fog}

$$(f\circ g)(x)=f(g(x))=\sqrt{3-2\times\frac{1}{3x-5}}=\sqrt{3-\frac{12}{3x-5}}$$

$$D_{fog}=\{x\in D_g \mid g(x)\in D_f\}$$

D_g: $3x-5\neq 0 \rightarrow x\neq \frac{5}{3}$ $\quad D_g=\mathbb{R}-\{\frac{5}{3}\}$

D_f: $3-2x\geq 0 \rightarrow -2x\geq -3 \xrightarrow{\div(-2)} x\leq \frac{3}{2} \rightarrow D_f=(-\infty,\frac{3}{2}]$

$$D_{fog}=\{\underbrace{x\in\mathbb{R}-\{\tfrac{5}{3}\}}_{①} \mid \underbrace{\tfrac{1}{3x-5}\in(-\infty,\tfrac{3}{2}]}_{②}\}$$

②: $\frac{1}{3x-5}\leq\frac{3}{2} \xrightarrow{\div 3} \frac{1}{3x-5}\leq\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{3x-5}-\frac{1}{2}\leq 0$

$$\frac{4-2x+5}{2(3x-5)}\leq 0 \rightarrow \frac{9-2x}{2(3x-5)}\leq 0$$


$9-2x$: $\frac{9}{2}$ ریشه، $3x-5$: $\frac{5}{3}$ ریشه

x		$\frac{5}{3}$		$\frac{9}{2}$	
$9-2x$	$+$	$+$	$+$	0	$-$
$3x-5$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
	$-$	∄	$+$	0	$-$

$$②=(-\infty,\tfrac{5}{3})\cup[\tfrac{9}{2},+\infty)$$

$$①\cap②=D_{fog}=(-\infty,\tfrac{5}{3})\cup[\tfrac{9}{2},+\infty)$$

مثال: اگر $f(x)=\frac{x}{x-2}$ و $g=\{(0,1),(1,2),(3,4),(4,3)\}$ باشد، fog را بیابید.



$$fog=\{(0,-1),(3,2),(4,3)\}$$

نکته: اگر fog را داشته باشیم و بخواهیم g را بدست آوریم. چون f را داریم، تابع fog را تشکیل می‌دهیم و با fog داده شده مساوی قرار می‌دهیم. معادله حاصل را حل می‌کنیم تا $g(x)$ بدست آید.

مثال: اگر $(fog)(x)=\frac{2x}{x-1}$ و $f(x)=\frac{x+1}{x-2}$ باشد، ضابطه $g(x)$ را بیابید.

$$(fog)(x)=f(g(x))=\frac{g(x)+1}{g(x)-2}=\frac{2x}{x-1}$$

$$2x(g(x)-2)=(x-1)(g(x)+1)$$

$$2xg(x) - 4x = xg(x) + x - g(x) - 1$$

$$2xg(x) - xg(x) + g(x) = 4x + x - 1$$

$$xg(x) + g(x) = 5x - 1 \Rightarrow g(x)(x+1) = 5x - 1 \rightarrow g(x) = \frac{5x-1}{x+1}$$

نکته: اگر در fog را درشته باشیم و بخواهیم f را بدست آوریم، ابتدا g را مساوی t می‌گیریم و x را برحسب t بدست می‌آوریم و در fog قرار می‌دهیم تا $f(t)$ بدست آید. $f(t)$ همان $f(x)$ است فقط به جای t، x می‌نویسیم.

مثال: اگر $f(\frac{x+1}{x}) = \frac{2x}{x-1}$ باشد، $f(x)$ را بیابید.

$$g(x) = \frac{x+1}{x} = \frac{t}{1} \rightarrow xt = x + 1 \rightarrow xt - x = 1$$

$$\rightarrow x(t-1) = 1 \rightarrow x = \frac{1}{t-1}$$

$$f(\underbrace{\frac{x+1}{x}}_{t}) = \frac{2x}{x-1} \rightarrow f(t) = \frac{2 \times \frac{1}{t-1}}{\frac{1}{t-1} - 1} = \frac{\frac{2}{t-1}}{\frac{1-t+1}{t-1}}$$

$$f(t) = \frac{2}{-t+2} \xrightarrow{t \to x} f(x) = \frac{2}{2-x}$$

نکته: ترکیب تابعی مانند f با خودش را بصورت $f \circ f$ می‌نویسند.

مثال: اگر $f=\{(2,1),(3,5),(7,2),(5,9),(4,3)\}$ ، $f \circ f$ را بیابید.

f f

$2 \to 1 \to X$

$3 \to 5 \to 9$

$7 \to 2 \to 1$

$5 \to 9 \to X$

$4 \to 3 \to 5$

$f \circ f=\{(3,9),(7,1),(4,5)\}$

مثال: اگر $f=\{(1,2),(3,-1),(4,5)\}$ باشد، $f \circ f^{-1}$ ، $f^{-1} \circ f$ را بیابید.

$f^{-1}=\{(2,1),(-1,3),(5,4)\}$

$f \circ f^{-1}$:

$2 \xrightarrow{f^{-1}} 1 \xrightarrow{f} 2$

$-1 \to 3 \to -1$

$5 \to 4 \to 5$

$f \circ f^{-1}=\{(2,2),(-1,-1),(5,5)\}$

$f^{-1}of$:

$1 \xrightarrow{f} 2 \xrightarrow{f^{-1}} 1$

$3 \to -1 \to 3$

$4 \to 5 \to 4$

$f^{-1}of = \{(1,1),(3,3),(4,4)\}$

نکته: اگر f تابعی وارون پذیر باشد آنگاه:

$$(f^{-1}of)(x) = x \quad ; \quad x \in D_f$$

$$(fof^{-1})(x) = x \quad ; \quad x \in D_{f^{-1}}$$

توجه کنید عکس گزاره بالا هم درست است یعنی اگر دو تابع در رابطه بالا صدق کنند آنگاه f تابعی وارون پذیر است که وارون آن f^{-1} خواهد بود.

مثال: ثابت کنید $f(x) = -\frac{7}{2}x - 3$, $g(x) = -\frac{2x+6}{7}$ وارون یکدیگرند.

$$(fog)(x) = f(g(x)) = -\frac{7}{2} \times \left(-\frac{2x+6}{7}\right) - 3$$

$$= \frac{2(x+3)}{2} - 3$$

$$= x + 3 - 3 = x$$

به عنوان تمرین ثابت کنید: $(gof)(x) = x$

مثال*: دو تابع $f=\{(2,5),(6,3),(3,7),(4,1),(1,9)\}$ و $g(x)=\frac{x}{x-1}$ داده شده‌اند. اگر $f^{-1}(g(2a))=6$ باشد، a را بدست آورید.

$$f^{-1}(g(2a))=6 \longrightarrow g(2a)=f(6)=3$$

$$3=\frac{2a}{2a-1} \longrightarrow 6a-3=2a \longrightarrow 4a=3$$

$$\longrightarrow a=\frac{3}{4}$$

به نام خدا

پایه دوازدهم تجربی

فصل اول: تابع

درس دوم: ترکیب تابع

قسمت دوم: تبدیل نمودار تابع

صفحات: ۱۵تا ۲۱

مدرس: سید ابوالفضل فاضلیان

اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

معاونت آموزش متوسطه

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی

گروه ریاضی استان همدان

در این درس می‌خواهیم عددی مانند a را در دامنه و برد تابع f اثر دهیم و تغییرات f را بررسی کنیم.


الف) انتقال افقی و عمودی:

۱- $f(x \pm a)$: برای رسم نمودار $y=f(x+a)$ نمودار f را روی محور xها a واحد به چپ و برای رسم نمودار $y=f(x-a)$ نمودار f را روی محور xها a واحد به راست منتقل کنیم. (انتقال افقی)

همچنین نقطه (x_0-a, y_0) از نمودار تابع $y=f(x+a)$ متناظر با نقطه (x_0, y_0) از نمودار $y=f(x)$ است.

دامنه تابع $f(x+a)$، xهای هستند که باعث می‌شوند عبارت $(x+a)$ اجازه ورود به f را پیدا کند.

$f(x+a)$



$$h(x)=f(x+a) \Rightarrow h(x_0-a)=f(x_0-a+a)=f(x_0)=y_0$$

۲- $f(x) \pm a$: برای رسم نمودار $y=f(x)+a$ نمودار f را روی محور yها a واحد به بالا و برای رسم نمودار $y=f(x)-a$ نمودار

f را روی محور yها a واحد به سمت پایین منتقل کنیم. (انتقال عمودی)

همچنین نقطه (x_0, y_0+a) از نمودار تابع $y=f(x)+a$ متناظر با نقطه (x_0, y_0) از نمودار $y=f(x)$ است.


ب) انقباض و انبساط افقی و محوری:

۱- $f(ax)$: اگر $0<a<1$ باشد نمودار f را در راستای محور xها با ضریب $\frac{1}{a}$ منبسط می‌کنیم. (انبساط افقی)

اگر $a>1$ باشد نمودار f را در راستای محور xها با ضریب $\frac{1}{a}$ منقبض می‌کنیم. (انقباض افقی)

همچنین نقطه $(\frac{x_0}{a}, y_0)$ از نمودار تابع $y=f(ax)$ متناظر با نقطه (x_0, y_0) از نمودار $y=f(x)$ است.

دامنه تابع $f(ax)$، xهایی هستند که با کدام عبارت $f(ax)$ می‌شود.



اجازه ورود به f را پیدا کند.

$h(x)=f(ax) \Rightarrow h(\frac{x_0}{a})=f(a\times\frac{x_0}{a})=f(x_0)=y_0$

نکته: در حالت انبساط و انقباض افقی xها طول نقاط f بر a تقسیم می‌شوند.

۲- $af(x)$: اگر $0<a<1$ باشد نمودار f را در راستای محور y ها با ضریب a منقبض می‌کنیم. (انقباض عمودی)

اگر $a>1$ باشد نمودار f را در راستای محور y ها با ضریب a منبسط می‌کنیم. (انبساط عمودی)

همچنین نقطه (x_0, ay_0) از نمودار تابع $y=af(x)$ متناظر با نقطه (x_0, y_0) از نمودار $y=f(x)$ است.

نکته: در حالت انبساط و انقباض عمودی y یا عرض نقاط f در a ضرب می‌شوند.

پس انعکاس:

۱- $-f(x)$: نمودار f را نسبت به محور xها قرینه می‌کنیم.

۲- $f(-x)$: نمودار f را نسبت به محور yها قرینه می‌کنیم.

نکته: در انبساط و انقباض‌ها اگر a منفی باشد ابتدا a را مثبت می‌گیریم و انبساط یا انقباض لازم را روی آن می‌دهیم، پس انعکاس را اعمال می‌کنیم.

ت) ترکیبی :

اگر بخواهیم نمودار تابعی به صورت $y = af(bx+c)+d$ را رسم کنیم،

اولویت تأثیرها را به صورت زیر رعایت می‌کنیم :

$$c \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow d$$

یعنی اول داخل پرانتز تغییرات روی x را اعمال می‌کنیم بعد بیرون پرانتز

تغییرات روی y. دقت کنید باز هم داخل پرانتز اعمال عکس حالت عادی رخ می‌دهد یعنی اول انتقال افقی (c) و بعد انبساط یا انقباض افقی با ضریب $\frac{1}{b}$.

در حالی که در بیرون پرانتز اول انبساط یا انقباض با ضریب a و بعد انتقال عمودی (d) اعمال می‌شود (به یاد دارید در اولویت اعمال اولویت ضرب و تقسیم از جمع و تفریق بالاتر بود)

ث) تأثیر قدر مطلق :

۱- $|f|$: نمودار f را رسم می‌کنیم، قسمتی از نمودار که زیر محور xها قرار دارد را نسبت به محور xها قرینه می‌کنیم.

۲- $f(|x|)$: قسمتی از نمودار f را که سمت چپ محور yها است حذف می‌کنیم و قرینه قسمتی را که سمت راست محور yها است نسبت به محور yها رسم می‌کنیم.

نکته : برای رسم نمودارهای تبدیل یافته کافی است تأثیرات را روی چند نقطه (نقاط شکستگی یا نقاط ابتدا و انتها یا تقاطع با محورها) اعمال کنید و با همان چند نقطه نمودار را رسم کنید.

مثال : نمودار توابع زیر را رسم کنید.


$|A| = |-A|$ یادآوری

$f(x) = |3-x| + 2$ رابطه

انتقال افقی ۳ واحد به راست

انتقال عمودی ۲ واحد به بالا


$f(x) = |-(3-x)| + 2 = |x-3| + 2$



ب) $y = -|\sqrt{x+1} - 1|$


انتقال اولیه یک واحد به چپ و انتقال عمودی یک واحد به پایین

$y = \sqrt{x+1} - 1$




تأثیر قدرمطلق:
قسمتی که زیر محورها است نسبت به محورها قرینه می‌کنیم

$y = |\sqrt{x+1} - 1|$




انعکاس:
نمودار را نسبت به محورها قرینه می‌کنیم.

$y = -|\sqrt{x+1} - 1|$




ب) $y=\sqrt{2x-1}+1$


$y=\sqrt{x-1}$ انتقال افقی یک واحد به راست



$y=\sqrt{2x-1}$ انقباض افقی با ضریب $\frac{1}{2}$




$y=\sqrt{2x-1}+1$ انتقال عمودی یک واحد به بالا




ت) $y=|2\sin 2x-1|$ $[0,\pi]$


$y=\sin x$




$y = \sin 2x$ انقباض افقی با ضریب $\frac{1}{2}$




$y = 2\sin 2x$ انبساط عمودی با ضریب ۲



$y = 2\sin 2x - 1$ انتقال عمودی یک واحد پایین




$y = |2\sin 2x - 1|$ تأثیر قدرمطلق: قسمتی که زیر محور xها است قرینه می‌کنیم.




ث) $f(x) = -2\sqrt{x} + 1$


$y = \sqrt{x}$




$y = 2\sqrt{x}$ انبساط عمودی با ضریب ۲




$y = -2\sqrt{x}$ انعکاس نسبت به محور xها




$f(x) = -2\sqrt{x} + 1$ انتقال عمودی یک واحد به




مثال: نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $y=1-f(x+2)$ را رسم کنید.




$y=f(x+2)$ انتقال افقی ۲ واحد چپ




$y=-f(x+2)$ انعکاس نسبت به محور xها




$y=1-f(x+2)$ انتقال عمودی یک واحد بالا




مثال : نمودار تابع $y=f(x)$ به شکل زیر است. نمودار $y=3f(\frac{1}{2}x+1)$ را رسم کنید.




$y=f(x+1)$ انتقال افقی یک واحد چپ




$y=f(\frac{1}{2}x+1)$ $\frac{1}{\frac{1}{2}}=2$ انبساط افقی با ضریب ۲




$y=3f(\frac{1}{2}x+1)$ انبساط عمودی با ضریب ۳




مثال: نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $y=|f(-x)|-2$ را رسم کنید.




$y=f(-x)$ انعکاس: قرینه‌ست به محور yها




$y=|f(-x)|$ تأثیر قدرمطلق: قسمت‌هایی که زیر محور x است قرینه می‌شود.



$y=|f(-x)|-2$ انتقال عمودی ۲ واحد پایین




مثال: نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $y=f(|x|)$ را رسم کنید.



قرینه‌ی نیمه‌ی راست نمودار

نیمه‌ی سمت راست نمودار

$y=f(|x|)$



مثال: ضابطه‌ی نقاط نمودار تابع f را در نظر می‌گیریم. پس نمودار به اندازه‌ی سه واحد به چپ منتقل می‌کنیم. ضابطه‌ی تابعی که نمودار آن رسم شده را بیابید.

$$f\left(\frac{x}{2}\right) \longrightarrow f\left(\frac{x+1}{2}\right) \Rightarrow y=f\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\right)$$

مثال: نمودار تابع $g(x)=2f(3x)$ را یک واحد به راست و دو واحد به بالا منتقل می‌کنیم. سپس طول و عرض نقاط این نمودار را نصف می‌کنیم. ضابطه تابعی که نمودار آن بدست آمده است را بنویسید.

$$2f(3(x-1)) = 2f(3x-3)$$

$$\rightarrow 2f(3x-3)+2$$

عرض‌ها ضرب ۱/۲ ، طول‌ها

$$\rightarrow \frac{1}{2}\left(2f(3(2x)-3)+2\right) = f(6x-3)+1$$

$$\Rightarrow \quad h(x)=f(6x-3)+1$$

مثال: منحنی تابع $y=|x-2|$ را سه واحد به چپ انتقال داده و قرینه شکل حاصل را نسبت به محور y‌ها تعیین می‌کنیم و با ضریب ۲ انبساط عمودی می‌دهیم. سپس قرینه آن را نسبت به محور xها رسم می‌کنیم، معادله منحنی جدید را بدست آورید.

$$f(x+3) \quad : \quad y=|x+3-2|=|x+1|$$

$f(-x+2)$: $y=|-x+1|$

$2f(-x+3)$: $y=2|-x+1|$

$-2f(-x+4)$: $y=-2|-x+1| = -2|1-x|$

مثال: با انجام متوالی کدام گزینه، نمودار $y=f(x)$ تبدیل به نمودار تابع $y=-\frac{1}{4}(1-x)$ می‌شود؟

۱) انتقال یک واحد به راست، قرینه نسبت به محور طول‌ها، انقباض $\frac{1}{4}$ واحد در راستای افقی

✓ ۲) انتقال یک واحد به چپ، قرینه نسبت به محور طول‌ها، انقباض $\frac{1}{4}$ واحد در راستای محوری

۳) انتقال یک واحد به چپ، قرینه نسبت به محور طول‌ها، انقباض $\frac{1}{4}$ واحد در راستای افقی

۴) انتقال یک واحد به راست، قرینه نسبت به محور طول‌ها، انقباض $\frac{1}{4}$ واحد در راستای محوری

گزینه ۲

$y=-\frac{1}{4}(1-x)$

- $-$: قرینه نسبت به محور xها
- $\frac{1}{4}$: انقباض محوری با ضریب $\frac{1}{4}$
- $(1-x)$: قرینه نسبت به محور طول‌ها
- $1-x$: انتقال افقی یک واحد چپ

مثال: کنکور ریاضی ۹۹

قرینهٔ نمودار تابع $f(x)=\sqrt{x}$ را نسبت به محور yها تعیین کرده، سپس منحنی حاصل را ۴ واحد به سمت راست، انتقال می‌دهیم. منحنی اخیر و منحنی اصلی نسبت به کدام خط، متقارن هستند؟


۱) $x=۱$ ۲) $x=۱/۵$ ۳) $x=۲$ ✓ ۴) $x=۲/۵$


$f(-x)$: $y=\sqrt{-x}$

$f(-(x-۴))$: $y=\sqrt{-(x-۴)}=\sqrt{-x+۴}=\sqrt{۴-x}$

$y=\sqrt{۴+x}$

۴ واحد به چپ






$y=\sqrt{۴-x}$ انعکاس: قرینه نسبت به محورها

$x=۲$

$y=\sqrt{۴-x}$



$y=\sqrt{x}$

گزینه ۳


مثال: کنکور ریاضی ۹۹ (خارج)

ابتدا قرینهٔ نمودار تابع $f(x)=(x-1)^2$ را نسبت به مبدأ مختصات رسم کرده، سپس منحنی حاصل را ۴ واحد به سمت بالا انتقال می‌دهیم. طول نقاط تلاقی منحنی اخیر با منحنی اصلی، کدام است؟

۱) ۲ ، ۰ ۲) ۱ ، −۱ ۳) ۲ ، −۱ ۴) ۱ ، −۲

$\begin{cases} x \to -x \\ y \to -y \end{cases}$ $\quad -y=(-x-1)^2=(x+1)^2$

$\Rightarrow y=-(x+1)^2 \xrightarrow{+4} g(x)=-(x+1)^2+4$



$f(x)=g(x) \Rightarrow (x-1)^2=-(x+1)^2+4 \to (x-1)^2+(x+1)^2=4$

روش تستی $\Rightarrow x^2-2x+1+x^2+2x+1=4 \to 2x^2+2=4 \to 2x^2=2$

$x^2=1 \to x=\pm 1$ طول نقاط تلاقی : گزینه ۲

مثال: کنکور تجربی ۹۹

نمودار تابع با ضابطهٔ $f(x)=\sqrt{x}$ را در امتداد محور xها، ۱۲ واحد در جهت مثبت و سپس در امتداد محور yها، ۲ واحد در جهت مثبت، انتقال می‌دهیم. فاصلهٔ نقطهٔ برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع f از مبدأ مختصات، کدام است؟

۱) $4\sqrt{15}$ ۲) $6\sqrt{7}$ ۳) $4\sqrt{17}$ ۴) $6\sqrt{10}$

$g(x)=\sqrt{x-12}+2$

$f(x)=g(x) \Rightarrow \sqrt{x}=\sqrt{x-12}+2 \xrightarrow[2]{\text{به توان}} x=(x-12)+4\sqrt{x-12}+4$

$8=4\sqrt{x-12} \xrightarrow{\div 4} 2=\sqrt{x-12} \xrightarrow[2]{\text{به توان}} 4=x-12 \Rightarrow x=16$

$f(16)=\sqrt{16}=4$ نقطهٔ برخورد $A(16,4)$

$OA=\sqrt{16^2+4^2}=\sqrt{256+16}=\sqrt{272}=\sqrt{16\times 17}=4\sqrt{17}$

گزینه ۳

مثال: کنکور تجربی ۹۹ (خارج)

نمودار تابع با ضابطهٔ $f(x)=x^2-2x;(x>1)$، مفروض است. قرینهٔ نمودار آن نسبت به محور xها را، ۱۶ واحد در امتداد محور yها در جهت مثبت انتقال می‌دهیم. فاصلهٔ نقطهٔ برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع f از مبدأ مختصات، کدام است؟

۱) $4\sqrt{5}$ ۲) $6\sqrt{2}$ ۳) $5\sqrt{2}$ ۴) $2\sqrt{5}$

$f(x) = x^2 - 2x + 1 - 1 = (x-1)^2 - 1$

قرینه‌ی نسبت به محور xها : $-f(x) = -(x-1)^2 + 1$

انتقال عمودی ۱۶ واحد به بالا : $g(x) = -(x-1)^2 + 1 + 16 = -(x-1)^2 + 17$

$f(x) = g(x) \Rightarrow (x-1)^2 - 1 = -(x-1)^2 + 17$

$\Rightarrow 2(x-1)^2 = 18 \xrightarrow{\div 2} (x-1)^2 = 9$

$\Rightarrow x - 1 = \pm 3 \Rightarrow \begin{cases} x - 1 = 3 \to x = 4 \\ x - 1 = -3 \to x = -2 \end{cases}$ غ ق ق

نقطه‌ی برخورد $A(4, 8)$ $\quad f(4) = (4-1)^2 - 1 = 8$

گزینه ۱ $\quad OA = \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{16 + 64} = \sqrt{80} = \sqrt{16 \times 5} = 4\sqrt{5}$

نکته : گاهی اوقات مختصات نقطه‌ای روی $f(x)$ داده می‌شود و مختصات نقطه متناظر با آن در $af(bx+c)+d$ خواسته می‌شود. در این حالت تمام مواردی که برای رسم نمودار

این بار می‌خواهیم روی نقطه داده شده اعمال می‌کنیم. همچنین برای تأثیر a و d می‌گوییم، عکس‌شون

$y=bx+c$ را بدست آوریم.

مثال: نقطه $A(-1,2)$ روی نمودار $y=f(x)$ است. نقطه متناظر با آن روی نمودار

$y=3f(2x-5)-7$ ، $A'(a,b)$ است. $a-b$ کدام است؟

۱) -2 ✓۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۴

$$t=2x-5 \Rightarrow t+5=2x \xrightarrow{\div 2} x=\frac{t+5}{2} \xrightarrow{-1} \frac{-1+5}{2}=\frac{4}{2}=2=a$$


$$b=2\times 3-7=-1 \Rightarrow A'(2,-1) \longrightarrow a-b=2-(-1)=3$$

گزینه ۲

نکته: در تابع $y=af(bx+c)+d$ ، a و d روی برد، b و c روی دامنه f تأثیری ندارند.

مثال: اگر دامنه تابع $y=f(x)$ بازه $(-5,14)$ باشد دامنه تابع $y=f(3x+4)$ را بیابید.

$f(3x+4)$



$$-5 < 3x+4 < 13 \xrightarrow{-4} -9 < 3x < 9$$

$$\xrightarrow{\div 3} -3 < x < 3$$

$$D_{f(3x+4)} = (-3, 3)$$

مثال: اگر برد تابع f بازه $(-2, 4)$ باشد، برد تابع $g(x) = 3f(x+1) - 1$ را بیابید.

برد تابع

$$-2 < f(x) < 4 \longrightarrow -2 < f(x+1) < 4 \xrightarrow{\times 3} -6 < 3f(x+1) < 12$$

$$\xrightarrow{-1} -7 < 3f(x+1) - 1 < 11 \Rightarrow -7 < g(x) < 11$$

$$R_{g(x)} = (-7, 11)$$

به نام خدا

پایه دوازدهم تجربی

فصل اول: تابع

درس سوم: تابع وارون

صفحه: ۲۴ تا ۲۸

مدرس: سید ابوالفضل فاضلیان

اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

معاونت آموزش متوسطه


اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی

گروه ریاضی استان همدان


وارون تابع :

برای برخی توابع ، تابعی دیگر وجود دارد که عکس تابع اصلی عمل کرده و خروجی را به ورودی تبدیل می‌کند . به چنین تابعی ، تابع معکوس یا تابع وارون می‌گوییم.


تعریف : وارون تابع f رابطه‌ای است که در آن به ازای هر خروجی f ، به ورودی مربوطه می‌رسیم . مثلاً اگر تابع f ، x_0 از دامنه را به y_0 از برد ببرد ، وارون تابع f که آن را با f^{-1} نشان می‌دهند عضو y_0 را به عنوان عضوی از دامنه خودش به x_0 از مجموعه برد می‌برد .




مثال :




خلاصه وارون تابع f :



وارون تابع خود تابع است :



خلاصه وارون تابع f :



تابع وارون پذیر : اگر وارون تابع f ، تابع باشد ، f را وارون پذیر می‌گوییم.

نکته : تابع f وارون پذیر است اگر و فقط اگر یک به یک باشد

۱) محاسبه وارون تابع از روی نمایش زوج مرتبی :

کافی است جای مولفه اول و دوم را عوض کنیم : $f^{-1}=\{(y,x)\mid (x,y)\in f\}$

مثال: وارون پذیر است $f=\{(1,6),(-1,5),(2,4)\}$ الف)

$f^{-1}=\{(6,1),(5,-1),(4,2)\}$


وارون پذیر نیست $g=\{(2,3),(4,-1),(5,2),(7,3)\}$ ب)


تابع نیست : $g^{-1}=\{(3,2),(-1,4),(2,5),(3,7)\}$ رابطه

۲) محاسبه وارون تابع از روی نمایش نمودار ون :

کافی است جهت فلش‌ها یا جای دایره‌ها را عوض کنیم .

مثال :






وارون پذیر

۱۳ محاسبه وارون تابع از روی نمایش دستگاه مختصات :


کافی است قرینه نمودار تابع f را نسبت به خط $y=x$ (نیمساز ناحیه اول و سوم) بیابیم

زیرا دو نقطه (x,y) و (y,x) نسبت به خط $y=x$ قرینه اند.

مثال:



تذکر: بهتر است برای دقیق‌تر شدن نمودار f^{-1} چند نقطه روی f پیدا کنیم و جای x و y را عوض کنیم تا نقطه روی f^{-1} به دست آید.



چند نکته: اگر f وارون پذیر باشد آنگاه

۱- اگر $f(a)=b$ آنگاه $f^{-1}(b)=a$. به عبارت دیگر اگر نقطه (a,b) روی نمودار تابع f باشد آنگاه نقطه (b,a) روی نمودار f^{-1} است.

۲- $(f^{-1})^{-1}(x)=f(x)$

۳- $D_{f^{-1}}=R_f$ ، $D_f=R_{f^{-1}}$

۴- اگر f و f^{-1} در نقطه (a,b) متقاطع باشند آنگاه $f(a)=b$ ، $f(b)=a$.

مثال: اگر $f(x)=\sqrt{18-x}+\sqrt[3]{18+x}$ باشد مقدار $f(9)+f^{-1}(6)$ را بیابید.

$$f(9)=\sqrt{18-9}+\sqrt[3]{18+9}=3+3=6$$

$$f^{-1}(6)=9$$

$$f(9)+f^{-1}(6)=6+9=15$$

مثال: اگر $g=\{(2,4),(3,2),(1,5),(5,-1)\}$ و $f=\{(3,2),(2,3),(4,-1),(5,6)\}$

و $f^{-1}(a)+g^{-1}(2)=6$ ، مقدار $g(a)$ را بدست آورید.

$g(3)=2 \rightarrow g^{-1}(2)=3$

$f^{-1}(a)+3=6 \rightarrow f^{-1}(a)=3 \rightarrow f(3)=a=2$

$g(a)=g(2)=4$

مثال: نمودار تابع $f(x)=-x^3+mx+n$ در نقطه $(\frac{1}{3},-1)$ نمودار تابع وارونش را قطع می‌کند.

مقدار m,n را بیابید.

$f(-1)=\frac{1}{3} \rightarrow \underbrace{-(-1)^3}_{+1}-m+n=\frac{1}{3} \rightarrow -m+n=-\frac{2}{3}$ ①

$f(\frac{1}{3})=-1 \rightarrow -\frac{1}{27}+\frac{1}{3}m+n=-1 \rightarrow \frac{1}{3}m+n=-1+\frac{1}{27}$

$\frac{1}{3}m+n=\frac{-26}{27} \xrightarrow{\times 3} m+3n=-\frac{26}{9}$ ②

$$\begin{cases} -m+n=-\frac{2}{3} \\ m+3n=-\frac{26}{9} \end{cases}$$

$4n=\frac{-32}{9}$

$\rightarrow n=\frac{-32}{9\times 4}=-\frac{8}{9} \rightarrow -m-\frac{8}{9}=-\frac{2}{3}$

$m=\frac{2}{3}-\frac{8}{9}=\frac{-2}{9}$

۴) یافتن ضابطه تابع وارون :

اگر تابع به صورت ضابطه بیانی داده شده باشد، مراحل زیر را برای آن انجام می‌دهیم :

۱- به جای $f(x)$ ، y قرار می‌دهیم .

۲- مانند یک معادله به آن نگاه می‌کنیم که می‌خواهیم x را بیابیم یعنی x را برحسب y می‌یابیم .

۳- به جای x ، $f^{-1}(x)$ و به جای y ، x قرار می‌دهیم .

مثال: وارون توابع زیر را بیابید.

۱) $f(x)=4x-7$

$$y=4x-7 \rightarrow y+7=4x \xrightarrow{\div 4} \frac{y+7}{4}=x$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x)=\frac{x+7}{4}$$

۲) $f(x)=\frac{3x+2}{x-1}$

$$\frac{y}{1}=\frac{3x+2}{x-1} \rightarrow yx-y=3x+2 \rightarrow yx-3x=2+y$$

$x(y-3)=2+y \rightarrow x=\frac{2+y}{y-3} \rightarrow f^{-1}(x)=\frac{x+2}{x-3}$

۳) $y=3-\sqrt{x+1}$

$\sqrt{x+1}=3-y \xrightarrow{\text{به توان ۲}} x+1=(3-y)^2 \rightarrow x=(3-y)^2-1$

$f^{-1}(x)=(3-x)^2-1$

روش دوم

$x+1=9-6y+y^2 \rightarrow x=y^2-6y+8$

$f^{-1}(x)=x^2-6x+8$

تذکر: اگر تابعی یک به یک نباشد پس وارون پذیر نیست ولی می‌توانیم با محدود کردن دامنه تابع آن را یک به یک کنیم و وارونش را به دست آوریم.

مثال: با محدود کردن دامنه تابع $f(x)=x^2+4x+5$، ضابطه تابع وارون را بیابید.

$D=(-\infty,-\frac{b}{2a}]=(-\infty,-\frac{4}{2}]=(-\infty,-2]$

با این دامنه تابع یک به یک و در نتیجه وارون پذیر می‌شود.

$f(x) = x^2 + 4x + 4 + 1 = (x+2)^2 + 1$


$x+2 \overline{)\, x \;\; -2}$

$y = (x+2)^2 + 1 \longrightarrow y-1 = (x+2)^2 \xrightarrow{\sqrt{\ }} \sqrt{y-1} = |x+2|$

$\sqrt{y-1} = -(x+2) \rightarrow \sqrt{y-1} = -x-2$

$x = -2 - \sqrt{y-1} \longrightarrow f^{-1}(x) = -2 - \sqrt{x-1}$

$f: \; x \leq -2$



f^{-1}

مثال: اگر $f(x)=\begin{cases}7x+2 & x<1\\ 5x+4 & x\geq 1\end{cases}$ ، نشان دادن f وارون‌پذیر است.

دامنه f^{-1} :

$$D_{f^{-1}} = R_f$$

$$x<1 \xrightarrow{\times 7} 7x<7 \xrightarrow{+2} 7x+2<9$$

$$x\geq 1 \xrightarrow{\times 5} 5x\geq 5 \xrightarrow{+4} 5x+4\geq 9$$

ضابطه f^{-1} :

$$y=7x+2 \rightarrow y-2=7x \rightarrow x=\frac{y-2}{7} \rightarrow f^{-1}(x)=\frac{x-2}{7}$$

$$y=5x+4 \rightarrow y-4=5x \rightarrow x=\frac{y-4}{5} \rightarrow f^{-1}(x)=\frac{x-4}{5}$$

$$f^{-1}(x)=\begin{cases}\frac{x-2}{7} & x<9\\ \frac{x-4}{5} & x\geq 9\end{cases}$$

ریاضی ۳

پایه دوازدهم تجربی

درسنامه، تمرین